

AKAGUSURI

TRADE MARK



腰痛・肩こり痛

熱解

赤ぐすり

第2類医薬品

頭痛


 TAIYODO SEIYAKU&CO.,LTD.  
 NARAKEN TAKATORICHO

創業明治八年

非ピリン系

第2類医薬品

## 解熱赤ぐすり

効能又は効果

- 1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2)悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15才以上……………1回1包  
 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。  
 服用間隔は6時間以上おくこと。  
 15才未満は服用しないこと。

成分・分量 1日量(2包)中

アスピリン……………800mg  
 エテンザミド……………400mg  
 無水カフェイン……………140mg

なお、添加物としてバレシヨデンブ、軽質無水ケイ酸、d-ボルネオールを含む。

使用上の注意

1. 次の人は服用しないこと。  
 (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  
 (3)15才未満の小児  
 (4)出産予定日12週以内の妊婦
2. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
3. 直射日光のあたらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
4. 小児の手の届かないところに保管すること。

2包入(1包800mg) ¥200+(税)

 副作用被害救済制度 電話：0120-149-931  
 配置期限

製造販売元


 太陽堂製薬株式会社  
 奈良県高市郡高取町下土佐578番地

電話 0744-52-2174



平成24年10月  
改訂

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 解熱赤ぐす里

## 第②類医薬品

### ⚠️ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないこと
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 15歳未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないこと
- 長期連用しないこと

### 🗨️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血	そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血がとまりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中痛み、過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 配置期限経過後は服用しないこと。

太陽堂製薬株式会社 連絡先電話番号 ☎ 0744-52-2174