

TRADE MARK



第②類医薬品

解熱鎮痛藥



非ピリン系

解熱鎮痛 アスナオール

製造販売元 中新薬業株式会社
富山県滑川市上小泉504-2
お客様相談室 電話076(475)2121 内線57(開発)

品目番号78-430

有効成分 1日量(2包)中(1包量: 1200mg)
アセトアミノフェン 600mg・エテンサミド 1000mg
アリルインプロピラーセチル尿素 120mg・無水カフェイン 120mg
添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、黄色5号を含有する。
(その他の添加物成分は、説明文書をご覧下さい)

效能效果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
(2) 要寒・寒熱時の解熱

用法用量

年齢	1回量	年齢	1回量
15歳以上	1包	11歳以上15歳未満	2/3包
7歳以上11歳未満	1/2包	3歳以上7歳未満	1/3包
1歳以上3歳未満	1/4包		

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

注音

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
 3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 4. 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
 5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
 6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
 7. 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

配置期限

3包入 ￥300+税



三

解熱鎮痛薬(顆粒剤)

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眼気等があらわれることがあります)
4. 服用前後は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）
 - (4) 高齢者
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなつた皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	
11歳以上15歳未満	2/3包	
7歳以上11歳未満	1/2包	2回を限度とする
3歳以上7歳未満	1/3包	
1歳以上3歳未満	1/4包	
1歳未満	服用しないこと	

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量（2包）中

アセトアミノフェン	600mg
エテンザミド	1000mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	120mg
無水カフェイン	120mg
添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、黄色5号、無水ケイ酸、カルメロースCa、メチセルロースを含有する。	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475)2121 内線 57(開発部)

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2