

TRADE

MARK

ずつう・はいた



のんでよくきく頭痛薬

# 頭痛歯痛薬 ケロール<sup>®</sup>

第②類医薬品



製造販売元 中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2

お客様相談室 電話076(475)2121

非ピリン系

## 解熱鎮痛薬

品目番号78-404

有効成分1日量(2包)中(1包量:1,080mg)

アスピリン	1,000mg
アセトアミノフェン	600mg
無水カフェイン	100mg
プロモバレリル尿素	400mg
添加物として乳糖水和物を含有する。(その他の添加物成分は、説明文書をご覧下さい)	

### 効能効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

### 用法用量

年齢	1回量
15歳以上(大人)	1包

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

### 注意

1. 次の人は服用しないで下さい。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人(3)15歳未満の小児(4)出産予定日12週以内の妊娠
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
3. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
7. 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

配置期限

3包入



この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

# 解熱鎮痛薬

第②類医薬品



## 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
  - (3) 15歳未満の小児
  - (4) 出産予定日12週以内の妊婦
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気等があらわれることがあります)
4. 服用前後は飲酒しないで下さい。
5. 長期連用しないで下さい。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 授乳中の人は
  - (4) 高齢者
  - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (6) 次の診断を受けた人  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする。息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつと/or;する、血尿等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 効能・効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

#### 用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上(大人)	1包	2回を限度とする
15歳未満		服用しないこと

なるべく空腹時をさけて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

#### <用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守して下さい。

#### 成分・分量 1日量(2包) 中

アスピリン.....	1000mg
アセトアミノフェン.....	600mg
無水カフェイン.....	100mg
プロモバレリル尿素.....	400mg
添加物として乳糖水和物、メチルセルロース、無水ケイ酸を含有する。	

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

#### お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076(475)2121

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元 中新薬業株式会社 富山県滑川市上小泉504-2