

服用される前に必ずこの文書を読んでください。また、薬とともに大切に保管してください。

いたみどめ わつさまし
鎮痛と解熱には

ツースサン

本剤は解熱鎮痛作用が優れた薬品を配合し、胃の障害を緩和する乾燥水酸化アルミニウムゲルを加えた、非ピリン系鎮痛解熱剤です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用、事故が起こりやすくなります。)

- ★ 次の人は服用しないこと。
 - (1) 15才未満の小児。
 - (2) 本剤による過敏症状(発疹、発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
 - (3) 本剤、または他の解熱鎮痛剤、かぜ薬を服用して喘息を起こしたことがある人。
- ★ 本剤を服用している間は、次のいずれかの医薬品も服用しないこと。
他の解熱鎮痛剤、かぜ薬、鎮痛薬、乗り物酔い薬。
- ★ 服用時は飲酒しないこと。
- ★ 長期間服用しないこと。



相談すること

- ★ 次の人は服用前に医師、または薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人または家族がアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍カイヨウ
- ★ 次の場合は、直ちに服用を止め、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状が現れた場合

| 関係部位 | 皮膚 | 消化器 | 精神神経系 |
|------|-----------|------------|-------|
| 症状 | 発疹、発赤、かゆみ | 悪心、嘔吐、食欲不振 | めまい |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診断を受けること。

| 症状の名称 | 症 状 |
|----------------------|--|
| ショック (アナフラキシー) | 服用後すぐに、ジンマシン、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり冷や汗、息苦しき等が現れる。 |
| 皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症 | 高熱を伴って、発疹、発赤、やけど様のみずぶくれなど、激しい症状が全身の皮膚、口や目の粘膜に現れる。 |
| 肝機能障害 | 全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる等)が現れる。 |
| ぜんそく | |

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

【 成分と働き 】

(一日量・3包分の合計 2,400mg)

| 成分名 | 分量 | 成分の働き |
|---------------|-------|------------------------|
| アスピリン | 800mg | 熱を下げる・痛みをやわらげる |
| アセトアミノフェン | 800mg | アスピリンと同じく熱を下げ、痛みをやわらげる |
| 無水カフェイン | 200mg | 痛みをやわらげる成分の働きを助ける |
| 乾燥水酸化アルミニウムゲル | 100mg | 胃の粘膜への負担をやわらげる |
| その他 賦形剤 | 500mg | バレイシヨデンプン 乳糖 |

【 効能・効果 】

- (1) 頭痛・歯痛・耳痛・咽喉痛・抜歯後の疼痛・関節痛・神経痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・生理痛・ねんざ痛・外傷痛の緩和
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

【 用法・用量 】

- (1) 大人 15才以上 1回 1包 1日 3回を限度としてなるべく空腹時をさけて服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。
- (2) 15才未満は服用しないこと。

【 保管・取扱い上の注意 】

- (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手がとどかないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因となったり、品質が悪くなる)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

□ 本剤についてのお問い合わせ先 □

何かお気付の点が有りましたら、お買い求めの薬局・薬店または下記まで、ご連絡いただけますようお願いいたします。

馬場親切堂 電話 095-822-3659
F A X 095-822-3659

販売元

ばばしんせつどう
馬場親切堂

電話 095-822-3659 F A X 095-822-3659
〒 850-0026 長崎市古町52

製造販売元

長崎県製薬協同組合 長崎市本河内3丁目11番1号 電話&FAX 095-823-5314