

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。  
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。



解熱鎮痛薬  
非ビリン系

ピューラ

第②類医薬品

ピューラは、解熱鎮痛作用をもつアセトアミノフェン(A)、エテンザミド(E)にこれらの働きを高めるカフェイン(C)を配合した(一般的にその頭文字をとって“ACE処方”とよばれる)処方、鎮痛作用のある生薬、シャクヤク、カンゾウより抽出したエキスとケイヒ末を配合した、解熱鎮痛薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- 次の人は服用しないでください。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 〈成分・分量〉

1日量2包(3.2g)中

アセトアミノフェン …	600mg
エテンザミド ……………	1000mg
無水カフェイン ………	180mg
シャクヤクエキス ………	200mg
カンゾウエキス ………	180mg
ケイヒ末…………………	200mg

添加物としてトウモロコシデンプン、炭酸カルシウム、乳糖を含有する。

### 〈効能・効果〉

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

### 〈用法・用量〉

年 齢	1回量
15歳以上	1包
11～14歳	2 / 3包
7～10歳	1 / 2包
3～6歳	1 / 3包
1～2歳	1 / 4包
1歳未満	服用しないこと

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は6時間以上おくこと。

#### 用法・用量に関する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

#### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

お問い合わせ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号