

2014年12月改訂

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

頭痛歯痛 ピタールA 頭痛歯痛 ノシチン

第②類
医薬品



【使用上の注意】

してはいけないこと



[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用や事故
が起こりやすくなります]

1. 次の人は服用しないでください

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3)15歳未満の小児。
- (4)出産予定日12週以内の妊婦。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。)
4. 服用前後は飲酒しないでください
5. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3)授乳中の人。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中中の痛み、過度の体温低下

裏面へ続く→

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死 融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、 のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤 等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目 が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。
ぜ ん そ く	息をするときゼーゼー、ヒューヒュー と鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮 膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、 息ぎれ、気分が悪くなりくらっとする、 血尿等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、
このような症状の持続又は増強が見られた場合に
は、服用を中止し、この文書を持って医師、歯科
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくなりえない場合は服
用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- (1)頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・
神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・
ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
(2)悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

15歳以上(大人)……………1日1包
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用して
ください。服用間隔は6時間以上おいてください。

成分・分量 (1包中)

アスピリン……………500mg
カフェイン……………75mg
プロモバレリル尿素……………150mg
添加物としてバレイシヨデンブンを含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管
してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わったりします。)
(4)期限の過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

株式会社日参製薬保寿堂

富山県滑川市高月町581番地

くすり相談窓口 TEL 076-475-0178