

づつう・はいた・神経痛 桃色くすり 第②類医薬品

効能又は効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・むねざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15才以上 1回1包

1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用すること。

服用間隔は6時間以上おくこと。

成分及び分量 1日量(2包)中

日局 アスピリン..... 850mg

日局 アセトアミノフェン..... 600mg

日局 無水力フェイン..... 150mg

添加物として/バレイショデンプン・龍腦・

食用赤色3号

製造販売元

日本医薬品製造株式会社
奈良県御所市古瀬18番地
TEL 0745-67-0015

注意

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。
- (4) 出産予定日12週以内の妊婦。

2. 服用が適さない場合があるので、服用前には医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

3. 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。

4. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

5. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

6. 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。

5包入(1包1.0g×5) **¥550**＋税

配置期限 Lot.

第②類医薬品

づつうに桃色くすり

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また必要なときに読めるように保存してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないで下さい。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - (3) 15歳未満の小児。(4) 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
- 服用前後は飲酒しないで下さい。 4. 長期連用しないで下さい。

⊕ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる

消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります、その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステイア フランス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

⚠ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- (4) 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。

製造販売元 日本医薬品製造株式会社 奈良県御所市古瀬18番地 TEL 0745-67-0015