

2014年8月 記載要領変更に伴う改訂

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

非ピリン系解熱鎮痛剤

ピンヘット 第②類医薬品



ピンヘットは解熱鎮痛を目的として、解熱鎮痛成分であるアスピリン（アセチルサリチル酸）及びアセトアミノフェンに、鎮痛効力の増強や脳血管収縮・中枢興奮作用を有する無水カフェインを配合して調整した内服散剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 15歳未満の小児。
 - 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用時は飲酒しないでください。
- 長期連用しないでください。

👨🏻‍⚕️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 授乳中の人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
そ の 他	鼻血、歯ぐきの出血、出血がとまりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

※裏面へ続く

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
シ ョ ッ ク (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
ぜんそく	息をするとゼーゼー、ヒューヒューと鳴る。息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる。疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする。血尿等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上がったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる。空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎 障 害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

3.5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・拔牙後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の量をなるべく空腹時をさけて水またはぬるま湯で服用してください。
また、服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	2 回まで
15歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量とその働き】 1日量〔2包（1包1.0g）〕中

成 分	分量	働 き
アスピリン	1000mg	熱を下げ、痛みを和らげて炎症をおさえます。アスピリンは非ピリン系の解熱鎮痛薬です。
アセトアミノフェン	600mg	熱を下げ、痛みをやわらげます。
無水カフェイン	200mg	痛みをおさえる成分の働きを助けるほか、頭痛をやわらげます。

添加物：パレイシヨデンブ

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)誤用を避け品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- (4)品質保持のため、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早くご使用ください。

【包 装】 20包・48包

【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。

千金丹ケアーズ株式会社 お客様相談室

電話：(087) 874-5500 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

 千金丹ケアーズ株式会社
香川県高松市国分寺町福家甲154番地2