

## ⚠ 使用上の注意 ❌ してはいけないこと 解熱鎮痛薬

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）  
 1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）  
 4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

■ 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍  
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 皮膚：発疹・発赤、かゆみ／精神神経系：めまい／消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振／その他：過度の体温低下  
 食以下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮剥離症候群、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなブツブツ（小潰瘍）が出る。全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりとすると息切がする・息苦しくなる、空咳、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢、尿量の減少等があらわれる。
ぜんそく	息をすときゼーゼー・ヒューヒューと聴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気  
 4. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

2包(1包1g×2)入 ¥200+税

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-933

頭痛・神経痛 第②類  
解熱鎮痛薬 医薬品



# ツツノイチ

効能又は効果

1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛 2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

大人(15歳以上)……………1回1包  
 7歳以上15歳未満……………1回1/2包  
 3歳以上7歳未満……………1回1/4包  
 3歳未満は服用しないこと  
 いずれも1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用すること。服用間隔は6時間以上おくこと。  
 (用法及び用量に関連する注意) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分及び分量 1日量(2包(2g))中

日局 アセトアミノフェン…600mg 添加物としてヒドロキノン  
 日局 エテンザミド……………600mg プロピルセルロース、グリ  
 日局 プロモバレリル尿素…400mg チルチン酸2K、グリセ  
 日局 無水カフェイン……………200mg コリン酸Ca、パレインヨ  
 デンプン、香料を含有する。

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気のない涼しい所に保管すること。(2) 小児の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(取用の原因になつたり品質が変わる。) (4) 11包を分割した残りは、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用すること。(5) 配置期限をすぎた製品は服用しないこと。

製造販売元 大和合同製薬株式会社 お問い合わせ先  
 奈良県橿原市川西町632-1 0744(27)3325

しんけいっつう

づつう・はいた



配置期限

## ⚠ 使用上の注意 ❌ してはいけないこと 解熱鎮痛薬

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)  
 1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。(3) 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)  
 4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

- 相談すること 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘 (水ぼうそう) 若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児 (15歳未満)。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍  
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 皮膚：発疹・発赤、かゆみ／精神神経系：めまい／消化器：吐き気・嘔吐、食欲不振／その他：過度の体温低下  
 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜炎候群 (ステープルス・ジアンデルセン症)、 中毒性表皮壊死症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のたれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ (小膿疱) が出る。全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸 (皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空咳、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛 (節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が認められた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 眠気  
 4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

2包 (1包 1g × 2) 入 ¥ 200 + 税

副作用被害救済制度

2012.01.20.14.9.9.3.1

## ZUTUNŌICHI 頭痛・神経痛

# ズツノーイチ

## 解熱鎮痛薬

### 第②類医薬品

### 効能又は効果

- 頭痛・歯痛・拔牙後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛 (生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

### 用法及び用量

- 大人 (15歳以上) …… 1回 1包  
 7歳以上15歳未満 …… 1回 1/2包  
 3歳以上 7歳未満 …… 1回 1/4包  
 3歳未満は服用しないこと。

いずれも1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用すること。服用間隔は6時間以上おくこと。

(用法及び用量に関連する注意)

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 成分及び分量 1日量 (2包 (2g)) 中

日局 アセトアミノフェン …… 600mg 添加物としてヒドロキシプロピ  
 日局 エテンザミド …… 600mg ルセルロース、グリチルリチン  
 日局 プロモバレリル尿素 …… 400mg 酸 2K、グリセロリン酸Ca、バレ  
 日局 無水カフェイン …… 200mg イシヨドンブ、香料を含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(服用の原因になったり品質が変わる。)(4) 1包を分割した残りは、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用すること。(5) 配置期限をすぎた製品は服用しないこと。



ズツノーイチ



配置期限

製造販売元 大和合同製薬株式会社  
 奈良県橿原市川西町632-1

お問い合わせ先  
 0744 (27) 3325