

非ピリン

TRADE MARK



神経痛 肩こり痛 歯痛

医薬品

ストップ<sup>®</sup>

和田製薬株式会社  
奈良県御所市池之内340

2.5

頭痛・歯痛  
神経痛 ストップ<sup>®</sup>

効能又は効果

- (1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- (2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15才以上……………1回1包  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさせて服用する。服用間隔は、6時間以上おくこと。

成分及び分量 1日量(2包中)

日局 アスピリン……………900mg  
日局 アセトアミノフェン……………400mg  
日局 無水カフェイン……………120mg  
添加物としてケイヒ末・バレिशョデンブ

注意

- 1. 次の人は服用しないで下さい。  
(1) 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。  
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。  
(3) 15歳未満の小児。
  - 2. 服用に際しては、説明書をよく読んで下さい。
  - 3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
  - 4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
  - 5. 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。
- 2包入(1包0.9g×2) ¥250(税別)

第②類医薬品

配置期限

製造販売元



和田製薬株式会社

奈良県御所市池之内340  
TEL0745-62-5624



# づつうにストップ

この説明書は、服用前に必ずお読みください。  
また必要なときに読めるように保存してください。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

- 次の人は服用しないで下さい。
  - 本剤による過敏症状（発疹・発赤、かゆみ、浮腫等）を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - 15歳未満の小児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
- 服用時は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

### 🏠 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 高齢者。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

## 第②類医薬品

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害 ぜんそく	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。

### (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

## ⚠ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- 配置期限の切れたものは服用しないで下さい。

製造発売元 **和田製薬株式会社** 奈良県御所市池の内340 TEL 0745-62-5624