

づつう・はいた

神経痛・肩こり痛に

鎮痛剤

第②類医薬品

づつう・はいた

神経痛・肩こり痛に

スピード

ストップ錠® V



和田製薬株式会社

非ピリン系

神経痛・肩こり痛に

づつう・はいた



箱



外装フィルム

づつう・はいた・神経痛・肩こり痛

6

づつう・はいた・神経痛・肩こり痛

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

スピードストップ錠[®]V

第②類医薬品

効能又は効果

(1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

(2) 悪寒・発熱時の解熱

用法及び用量

15歳以上 1回…2錠/7歳以上15歳未満 1回…1錠
1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。服用間隔は、4時間以上おいて下さい。

成分及び分量 1日量(6錠)中

日局 アセトアミノフェン …………… 900mg
日局 エテンザミド …………… 800mg
アリルイソプロピルアセチル尿素 …… 150mg
日局 無水カフェイン …………… 180mg

添加物として、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、
ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、
ステアリン酸マグネシウムを含有する。

配置期限

△使用上の注意

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 7歳未満の小児。
- 服用後、薬物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
- 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。

12錠(6回分) **¥600(税別)**

製造販売元

和田製薬株式会社
奈良県御所市池之内340
TEL 0745-62-5624

づつう、はいた、解熱にスピードストップ錠.V

第②類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- 次の人は服用しないで下さい。
 - 本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
 - 7歳未満の幼児。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬。
- 服用後、乗物又は、機械類の運転操作をしないで下さい。
- 服用時は飲酒しないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。
 - 高齢者。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい。

この説明書は、服用前に必ずお読みください。
また必要ときに読めるように保存してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 中毒性表皮壊死症	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮ふ、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害 ぜんそく	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 5~6回服用しても症状がよくなる場合

⚠ 服用時の注意

- 7歳以上の小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 7歳以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して下さい。
- 錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

⚠ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。
- 配置期限の切れた製品は服用しないで下さい。

製造販売元 和田製薬株式会社 奈良県御所市池の内340 TEL 0745-62-5624

副作用被害救済制度
☎0120-149-931