

日本薬局方 ボウイ

第2類医薬品

用法及び用量

大人（15歳以上）は1日量10gを、水約600mℓをもって煮て約400mℓに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

効能又は効果

次の症状の緩和：筋肉痛、神経痛、関節痛

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



4 993512 550636

LOT 609111

500 g

刻

製造販売元



株式会社小島漢方

大阪府中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

保管及び取扱い上の注意

- ・小児の手の届かない所に保管してください。
- ・直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ・本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- ・誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- ・本品には品質保持（カビ・虫害防止）のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- ・脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。