

第②類医薬品 鎮痛 解熱剤

頭痛・神経痛



速治散ゴールド

用法及び用量

大人(15才以上)1回1包、11才以上15才未満1回 $\frac{1}{2}$ 包、8才以上11才未満1回 $\frac{1}{2}$ 包、5才以上8才未満1回 $\frac{1}{2}$ 包、5才未満服用しないこと
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用する。
服用間隔は6時間以上おくこと。
注意:小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

効能及び効果

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒・発熱時の解熱

成分及び分量 1日量2包(1包1,200mg)中
アセトアミノフェン…600mg、エテンザミド…500mg、
プロモバルビル尿酸…400mg、無水カフェイン…200mg
添加物: ケイヒ末、バレイシヨダン、カルメロースカルシウム

⚠ 使用上の注意 ⚠ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)
4. 服用前後は飲酒しないこと 5. 長期連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳、幼・小児(15才未満)。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の診断を受けた人。心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 皮膚部に発疹・発赤、かゆみ、消化器部に吐き気、嘔吐、食欲不振、精神神経系にめまい、その他過度の体温低下の症状があらわれた場合。

配置期限 製造番号 ¥385(税込)(本体価格¥350)

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のがすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステvens Johnson症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る。中毒性表皮剥離症候群、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、腰痛(部々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりと息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと喘ぎ、息苦しい等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 2. この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の折りを折り返して保管し2日以内に服用すること。(5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと

3包入り 製造販売元 新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

