

# 解熱鎮痛薬 新トアノージZ

第②類医薬品

## 特徴

「新トアノージZ」は解熱鎮痛薬アセトアミノフェン、催眠鎮静薬プロモバレリル尿素、頭痛を和らげる無水カフェインに加え、鎮痛・鎮けい作用のある「芍薬」、抗炎症作用のある「甘草」、解熱作用のある「桂皮」、以上3種の生薬を配合した胃にやさしい解熱鎮痛薬です。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (眠気等があらわれることがある。)

#### 4. 服用前後は飲酒しないこと

#### 5. 長期連用しないこと

### 相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり，少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる，空せき，発熱等がみられ，これらが急にあらわれたり，持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー，ヒューヒューと鳴る，息苦しい等があらわれる。

- 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること  
眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この文書を持って医師，歯科医師，薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒・発熱時の解熱

## 【用法・用量】

次の量を1日3回を限度とし，なるべく空腹時をさけて服用する．服用間隔は4時間以上おくこと．

年 齢	1 回 量
成人（15才以上）	2カプセル
7才以上15才未満	1カプセル
7才未満	服用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には，保護者の指導監督のもとに服用させること．

## 【成分・分量】

1日量（6カプセル）中

成 分	含有量	各成分の作用
アセトアミノフェン	900mg	解熱鎮痛薬．痛みの緩和や悪寒発熱時の解熱作用があります．
プロモバレリル尿素	210mg	催眠鎮静薬．痛みを和らげる作用があります．
無水カフェイン	90mg	緊張を和らげる効果があります．
シクヤク末	267mg	鎮痛・鎮けい作用があります．
カンゾウ末	200mg	抗炎症作用があります．
ケイヒ末	134mg	解熱作用があります．

添加物：乳糖，ステアリン酸Mg及びカプセル本体にゼラチン，ラウリル硫酸Na，酸化チタンを含有

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること．
- 小児の手の届かない所に保管すること．
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる．）．



製品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店または下記までお願いします．  
北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55  
電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土，日，祝日を除く）