

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

頭痛・歯痛・発熱・生理痛に

第②類医薬品

〈解熱鎮痛薬〉

バッサミン®S

Bassamin®S

〔合成ヒドロタルサイト配合〕

バッサミンSは痛みや発熱にひろく使われている非ピリン系のアスピリン製剤です。アスピリンはプロスタグランジン抑制等多面的機序により体温調節中枢等に働き、解熱や鎮痛に優れた効果を発揮します。

バッサミンSは合成ヒドロタルサイトを配合する事により、胃への負担を和らげ有効成分の吸収を促進し、解熱・鎮痛効果を高めます。

* 小さい錠剤でのみやすくなりました。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
 - (3)15歳未満の小児
 - (4)出産予定日12週以内の妊婦
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3. 服用前後は飲酒しないでください。
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)授乳中の人
 - (4)高齢者
 - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6)次の診断を受けた人
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系	めまい
その他	鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

症状の名称	症 状
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
○悪寒・発熱時の解熱

【用法・用量】

次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

年 齢	1回量
成人（15歳以上）	2錠
15歳未満	服用しないでください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながります)



【成分・分量】本品1錠中

アスピリン（アセチルサリチル酸）……………330mg
合成ヒドロタルサイト……………100mg
添加物として、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、青色1号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(4)使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
(5)ご使用の時は1錠ずつ押し出してください。
(6)包装シートを切り離す際などに、変質の原因となりますので、服用しない錠剤の裏のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。また、切り離した包装シートのカドで手指などを傷つけないようご注意ください。

※【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

武田テバファーマ株式会社 武田テバDIセンター
〒453-0801 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号
TEL 0120-923-093
受付時間 9:00～17:30 (土日祝日・弊社休業日を除く)

※製 造 武田テバファーマ株式会社
販売元 名古屋市中村区太閤一丁目24番11号