

商標



登録

第②類  
医薬品

じん  
ぐう  
さん

# 神宮散

奈良県橿原市兵部町二一九  
製造販売元

日新製薬株式会社

この商品のお問い合わせは ☎(0744)22-2381

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗してはいけないこと

1. 次の人は服用しないで下さい

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼小児(15才未満)。(5) 高齢者。(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍の診断を受けた人。

### 保管及び取扱い上の注意

(1) 高温・直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(4) 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。

### 効能・効果

(1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛  
(2) 悪寒・発熱時の解熱

### 用法・用量

15歳以上 …… 1回1包 7才以上11才未満… 1回1/2包  
11才以上15才未満… 1回2/3包 3才以上7才未満… 1回1/3包  
1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて、服用する。  
服用間隔は、6時間以上おくこと。小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用して下さい。

### 成分・分量 1日量(2包中)

日局アセトアミノフェン… 600mg 日局エテンザミド… 800mg  
日局無水カフェイン… 200mg  
添加物としてケイヒ、カンゾウ、バレিশヨテンブシ、軽質無水ケイ酸を含有する。

2 包入 ¥ 200



配置期限

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

この使用上の注意は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

## 解熱鎮痛薬

第②類医薬品

### ⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人、(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3. 服用前後は飲酒しないこと

4. 長期連用しないこと

👩 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 授乳中の人、(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)、(5) 高齢者、(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、(7) 次の診断を受けた人、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振	そ の 他	過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の折り口を折り返して保管し2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限経過後は服用しないこと。