

第2類医薬品



寝つきが悪い 眠りが浅い

一時的な不眠による

このような症状の緩和

睡眠改善薬 アンミナイト®

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

アンミナイトはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売名:アンミナイト

〔使用上の注意〕**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる) **1.次の人は服用しない** (1)妊婦又は妊娠していると思われる人。(2)15才未満の小児。(3)日常的に不眠の人。(4)不眠症の診断を受けた人。 **2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しない** 他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) **3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしない** **4.授乳中の人**は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避ける **5.服用前後は飲酒しない** **6.寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しない**

相談すること **1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談する** (1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。排尿困難 (5)次の診断を受けた人。緑内障、前立腺肥大 **2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する** 発疹・発赤、かゆみ/皮膚、胃痛、吐き気・嘔吐、食欲不振/消化器、めまい、頭痛、起床時の頭重感、昼間の眠気、気分不快、神経過敏、一時的な意識障害(注意力の低下、ねぼけ様症状、判断力の低下、言動の異常等)/精神神経系、動悸/循環器、排尿困難/泌尿器、倦怠感/その他 **3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する** 口のかわき、下痢 **4.2~3回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する**

その他の注意 翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることもある。

〔効能〕一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い

〔用法用量〕寝つきが悪い時や眠りが浅い時、成人(15才以上)、1回1瓶(30mL)を1日1回就寝前に服用する。〈注意〉(1)用法・用量を厳守。(2)1回1瓶(30mL)を超えて服用すると、神経が高ぶるなど不快な症状があらわれ、逆に眠れなくなることがある。(3)就寝前以外は服用しない。

〔成分〕1日量(1瓶)中 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg 添加物:エリスリトール、スクラロース、カラメル、安息香酸Na、クエン酸Na、香料、エタノール、バニリン、D-ソルビトール、pH調節剤2成分、その他1成分

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管する。(2)小児の手のとどかない所に保管する。(3)他の容器に入れかえない。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しない。