

鎮 静 剤

ウツト®

第②類医薬品

複雑化する現代社会に伴い、色々なことで神経を使うことが多くなっています。このようなストレスによって、様々な神経症状を引き起こすことが知られています。

ウツトは、精神の興奮や神経衰弱などの鎮静を目的とした薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故 が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい
他の鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい
4. 服用前後は飲酒しないで下さい
5. 過量服用、長期連用しないで下さい



■ 相 談 す る こ と



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に
相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるので、直ちに服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師
又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることが
あるので、このような症状の持続又は増強が
見られた場合には、服用を中止し、医師、
薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる
ない場合は、服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
下さい

成分及び分量

本品1日量（3錠）中

プロモバレリル尿素	250mg
アリルイソプロピルアセチル尿素	150mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩	25mg

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mgを含有します。

効能又は効果

頭痛、精神興奮、神経衰弱、その他鎮静を必要とする諸症



精神興奮



神経衰弱



用法及び用量

1日1～3回食後に服用して下さい。

年 齢	大人（15才以上）	15才未満
1回量	1錠	服用しないこと

<用法及び用量に関連する注意>

(1) 用法及び用量を厳守して下さい。

(2) 錠剤の取り出し方


右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないで下さい。



■お問い合わせ先。

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地