#### 服用の前にこの説明書を必ずお読みください。 また、必要なときに読めるよう保管してください。



# 睡眠改善薬S 【睡眠改善薬】

一時的な不眠による次の症状の緩和 寝つきが悪い・眠りが浅い

睡眠改善薬Sは、抗ヒスタミン剤ジフェン ヒドラミン塩酸塩を配合した一般用医薬品の 睡眠改善薬です。寝つきが悪い、眠りが浅いと いった一時的な不眠症状の緩和に効果をあらわ します。中身が液状のソフトカプセルです。 1回1カプセルを就寝前に服用してください。





## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
  - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (2) 15才未満の小児。
  - (3) 日常的に不眠の人。
  - (4) 不眠症の診断を受けた人。
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の催眠鎮静薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗レスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気をもよおして事故を起こすことがあります。また、本剤の服用により、翌日まで眠気 が続いたり、だるさを感じる場合は、これらの症状が消えるまで、乗物又は機械類の運転 操作をしないでください。)

- 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 5. 服用前後は飲酒しないでください
- 6. 寝つきが悪い時や眠りが浅い時のみの服用にとどめ、連用しないでください



## 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 高齢者。(高齢者では眠気が強くあらわれたり、また反対に神経が高ぶるなどの症状が あらわれることがあります)
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。 排尿困難
  - 緑内障、前立腺肥大 (5) 次の診断を受けた人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、 この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃痛、吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、頭痛、起床時の頭重感、昼間の眠気、気分不快、神経過敏、一時的な意識障害(注意力の低下、ねぼけ様症状、判断力の低下、言動の異常等)
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	倦怠感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られ た場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して ください

口のかわき、下痢

4. 2~3回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意 翌日まで眠気が続いたり、だるさを感じることがあります。

### [効能・効果]

一時的な不眠の次の症状の緩和:寝つきが悪い、眠りが浅い

### 「用法・用量)

寝つきが悪い時や眠りが浅い時、次の1回量を1日1回就寝前に水又はぬるま湯で服用してください。

年令	大人(15才以上)	15 才未満
1回量	1 カプセル	服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)1回1カプセルを超えて服用すると、神経が高ぶるなど不快な症状があらわれ、 逆に眠れなくなることがあります。
- (3) 就寝前以外は服用しないでください。
- (4) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシー トの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔 を破り、取り出してお飲みください。(誤って そのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き 刺さるなど思わぬ事故につながります)



### **「成分・分量]** 1カプセル中

ジフェンヒドラミン塩酸塩・・・・ · · 50mg

添加物:ゼラチン、グリセリン、マクロゴール

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内で あっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)
- (5) カプセル剤は、吸湿しやすいので、ぬれた手などで触れないように注意してください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

# 奥田製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 06-6351-2100 (代表)

受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)

製造販売元

# **(**●KUDA

大阪市北区天満1丁目4番5号 https://www.okudaseivaku.co.ip/

