

第2類医薬品

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

生薬主剤の鎮静薬

ノイロンホルテS

「病は気から」という諺(ことわざ)があるように、古くから精神的な悩みごとから身体に異常がおこることがよく知られています。

社会生活の複雑化に伴い、日常のわずらわしいことや、職業上の過労などによって精神面の消耗が激しくなり、これらに起因する神経症状を訴える人々が近年ますます増加しています。

ノイロンホルテSは緊張感・興奮感・いらいら感やそれに伴う頭重・疲労倦怠感などの神経症状に対して、優れた緩和効果を発揮します。

(1) ノイロンホルテSは薬用植物から抽出したエキスを主剤とした糖衣錠です。

(2) ノイロンホルテSの薬効の発現はやや緩徐ですが、エキス中の有効成分の作用によって、神経の緊張をほぐし、興奮をしずめます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の鎮静薬
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】


緊張感・興奮感・いらいら感の鎮静、
上記に伴う頭重・疲労倦怠感の緩和

【用法・用量】

下記の量を水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	2回
15才未満	使用しないこと。	

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 錠剤の取り出し方(シートごと飲み込むなどのどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。)



〔成分・分量〕

ノイロンホルテSは、帯黄緑色の糖衣錠で、6錠中に次の成分を配合しています。

成分	分量（原生薬換算量）	作用
パッシフローラ乾燥エキス	100.0mg (パッシフローラとして 700.0mg)	トケイソウ（トケイソウ科）の全草から製した乾燥エキスで、鎮静・鎮痙・頭重緩和作用があります。
カノコソウエキス	240.0mg (カノコソウとして 1200.0mg)	カノコソウ（オミナエシ科）の根及び根茎から製したエキスで、鎮静作用や神経疲労に伴う頭重緩和作用があります。
ホップ乾燥エキス	60.0mg (ホップとして 852.0mg)	ホップ（クワ科）の成熟した果穂から製したエキスで、自然な鎮静作用があり、カノコソウと協力的に作用し、パッシフローラの鎮静作用を補います。
チョウトウコウ乾燥エキス	45.0mg (チョウトウコウとして 450.0mg)	カギカズラ（アカネ科）の鉤（かぎ）を伴う茎から製したエキスで、鎮痙作用があり、パッシフローラ及びカノコソウの鎮静作用を補佐します。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、CMC-Ca、乳糖、メタケイ酸アルミン酸Mg、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、アラビアゴム、タルク、ポビドン、酸化チタン、白糖、青色1号、赤色2号、黄色4号（タートラジン）、カルナウバロウを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9：00～17：00