

販売名：ポンツシン内服液

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
 - (1) 次の症状のある人。胃酸過多
 - (2) 次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の眠気防止薬
3. コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないこと
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

〔効能・効果〕

ねむけ、倦怠感の除去

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1日1回、1回1瓶(50mL)を添付のビニールストローにて服用する。

なお、15才未満は服用しないこと。

- (1) 1日2回以上の服用は避けること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

第3類医薬品

目がさめる



ねむけ・だるさに

ポンツシン内服液



ゼリア新薬

〔成分〕1瓶(50mL)中

- カフェイン水和物……………200mg
 - ゴオウチンキ……………0.05mL
 - タウリン……………500mg
 - イノシット……………100mg
 - ビタミンB₁塩酸塩……………20mg
 - ビタミンB₂リン酸エステル……………1.86mg
 - ビタミンB₆……………5mg
 - パントテン酸カルシウム……………10mg
- 添加物：L-グルタミン酸Na, DL-リンゴ酸, クエン酸, 白糖, ブドウ糖, l-メントール, 香料, グリセリン, エタノール

●本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは成分のビタミンB₂リン酸エステルによるものですので、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室 ☎03-3661-2080

製造販売元



長生堂製薬株式会社

徳島県徳島市国府町府中92番地

第3類医薬品

販売名：ポンツシン内服液

〔使用上の注意〕

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
(1) 次の症状のある人。胃酸過多
(2) 次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の眠気防止薬
3. コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないこと
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

〔効能・効果〕

ねむけ、倦怠感の除去

〔用法・用量〕

成人(15才以上) 1日1回、1回1瓶(50mL)を添付のビニールストローにて服用する。なお、15才未満は服用しないこと。

(1) 1日2回以上の服用は避けること。(2) 用法・用量を厳守すること。

製造番号：C2001

使用期限：2015.3

〔年.月〕

目がさめる



ねむけ・だるさに

ポンツシン内服液

第3類医薬品



50mL×2

ゼリア新薬

〔成分〕1瓶(50mL)中
 カフェイン水和物 ……200mg
 ゴオウチンキ ……0.05mL
 タウリン ……500mg
 イノシット ……100mg
 ビタミンB1塩酸塩 ……20mg
 ビタミンB2リン酸エステル ……1.86mg
 ビタミンB6 ……5mg
 パントテン酸カルシウム ……10mg
 添加物：L-グルタミン酸Na, DL-リンゴ酸, クエン酸, 白糖, ブドウ糖, l-メントール, 香料, グリセリン, エタノール

●本剤の服用により、尿が黄色になることがあるが、これは成分のビタミンB2リン酸エステルによるものですので、ご心配ありません。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931


(発売元)東京都中央区日本橋小舟町10-11
ゼリア新薬工業株式会社
 お客様相談室 ☎03-3661-2080
 受付 9:00~17:50(土・日・祝日を除く)

製造販売元
Chosei 長生堂製薬株式会社
 徳島県徳島市国府町府中92番地



4 987103 032700

目がさめる



ねむけ・だるさに

ポンツシン内服液

第3類医薬品



50mL×2

ゼリア新薬