

【使用上の注意】**【してはいけないこと】**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）1.次の人は服用しないでください（1）胃酸過多のある人。（2）心臓病、胃潰瘍の診断を受けた人。2.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の眠気防止薬 3.コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください 4.短期間の服用にとどめ、連用しないでください

**【相談すること】** 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください（1）医師の治療を受けている人。（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。（3）授乳中の人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この瓶を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

消化器：食欲不振、吐き気・嘔吐

精神神経系：ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛

循環器：動悸

【効能・効果】 睡気(ねむけ)・倦怠感の除去

【用法・用量】 成人(15才以上) 1日1回1瓶(30mL)を服用してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)15才未満は服用しないでください。
- (2)用法・用量を厳守してください。
- (3)1日2回以上の服用は避けてください。

【成分】 1瓶(30mL)中

カフェイン水和物 150mg、チアミン塩化物塩酸塩 10mg、ピリドキシン塩酸塩 5mg、グリセロリン酸カルシウム 20mg、ニコチン酸アミド 15mg、タウリン 1,000mg

添加物：D-ソルビトール、白糖、アルコール、プロピレングリコール、クエン酸、安息香酸Na、パラベン、エチルパニリン、カラメル、L-グルタミン酸Na、パニリン、香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度  
電話0120-149-931



使用期限

製造番号

# ねむけ・ だるさに

30mL

## 医薬品

コーヒー風味の  
ねむけ除去剤

# イスタロンモカ®内服液

## 第3類医薬品

発売元



イスタロン製薬株式会社

東京都新宿区西新宿3-20-2

お客様相談室 電話 0120-028-193

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

<https://www.ssp.co.jp/>

製造販売元

同仁医薬化工株式会社

福島県福島市瀬上町東中川原 8-1