

第3類医薬品

販売名:ハイエナル"88"内服液

【効能・効果】

眠気・倦怠感の除去

【用法・用量】

次の1回量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (30mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)1日2回以上の服用は避けてください。
- (2)定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1びん(30mL)中
クエン酸カフェイン 150mg、カ
フェイン水和物 50mg、安息香酸
ナトリウムカフェイン 50mg、チ
アミン硝化物 10mg、L-グルタ
ミン酸ナトリウム 10mg、パント
テン酸カルシウム 10mg、カルニ
チン塩化物 50mg、タウリン 500
mg、ガナ流エキス 200mg

添加物:安息香酸、バラベン、黄色5
号、青色1号、香料、クエン酸水和物、
D-ソルビトール、エタノール、白糖

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい
所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管
してください。
- (3)他の容器に入れ替えないで
ください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は、服
用しないでください。

win

第3類医薬品

眠気 だるさ

三種のカフェイン

+ガラナ 流エキス配合

コーヒー風味

30mL×2本入 ハイエナル"88"内服液



ハイエナル"88"内服液
米田薬品株式会社

コーヒー風味 
30mL×2本入



第3類医薬品

押し開けてください

30mL×2本入

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

▲ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 次の症状のある人。胃酸過多
(2) 次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の眠気防止薬
3. コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸



米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2

お客様相談窓口 電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

電話: 0120-149-931
(フリーダイヤル)