

**第3類医薬品**

# 眠気やだるさに



30mL

3種のカフェイン  
+ガラナ流エキス配合

米田薬品株式会社  
大阪市浪速区塩草3丁目2-2

**ビタミンB1  
カルニチン塩化物  
タウリン**

**3種のカフェイン  
+ガラナ流エキス配合**

ハイエナル"88"内服液  
**30mL×2本入**

**第3類医薬品**

販売名:ハイエナル"88"内服液  
(効能・効果)  
眠気・倦怠感の除去

(用法・用量)  
次の1回量を服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (30mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>  
(1)1日2回以上の服用は避けてください。  
(2)定められた用法・用量を厳守してください。

(成分・分量) 1びん(30mL)中  
クエン酸カフェイン 150mg、カ  
フェイン水和物 50mg、安息香酸  
ナトリウムカフェイン 50mg、チ  
アミン塩化物 10mg、L-グルタ  
ミン酸ナトリウム 10mg、パント  
テン酸カルシウム 10mg、カルニ  
チン塩化物 50mg、タウリン 500  
mg、ガラナ流エキス 200mg  
添加物:安息香酸、バラベン、黄色5  
号、青色1号、香料、クエン酸水和物、  
D-ソルビトール、エタノール、白糖

(保管及び取扱い上の注意)  
(1)直射日光の当たらない涼しい  
所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管  
してください。  
(3)他の容器に入れ替えないで  
ください。(誤用の原因になっ  
たり品質が変わります。)  
(4)使用期限を過ぎた製品は、服  
用しないでください。

押して開けてください **30mL×2本入**

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**△ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の人は服用しないでください  
(1) 次の症状のある人。胃酸過多  
(2) 次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍  
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の眠気防止薬  
3. コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しな  
いでください  
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

**■ 相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 授乳中の人。  
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

米田薬品株式会社  
大阪市浪速区塩草3丁目2-2  
お客様相談窓口 電話 06-6562-7411  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/  
電話: 0120-149-931