

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



乗りもの酔いに/酔ってからでも効く

こどもセンパア S

第2類医薬品

〈乗物酔い薬〉

◆こどもセンパア Sは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにするための、お子さま用の薬です。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

① 本剤を服用している間は、次のいずれの
医薬品も使用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳
去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有
する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

② 服用後、乗物又は機械類の運転操作を
しないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状
があらわれることがあります)



相談すること



① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病

② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この説明書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症状 |
|-------|---------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 精神神経系 | 頭痛 |
| 泌尿器 | 排尿困難 |
| その他 | 顔のほてり、異常なまぶしさ |

③ 服用後、次の症状があらわれることがある
ので、このような症状の持続又は増強が見
られた場合には、服用を中止し、この説明書
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。
乗物酔いの予防には乗車船30分前に1回量を服用します。

なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおき服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|--------|--|--------|
| 11~14才 | 2錠  | 1日2回まで |
| 3~10才 | 1錠  | |
| 3才未満 | 服用しないこと | |

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (4)錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



成分

2錠中

| 成分 | 分量 | はたらき |
|-----------------|--------|-------------------------------|
| 塩酸メクリジン | 25mg | 嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気をおさえます。 |
| スコポラミン臭化水素酸塩水和物 | 0.16mg | 自律神経の興奮状態を緩和し、めまい・吐き気をおさえます。 |

添加物：D-マンニトール、ブドウ糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、香料、ゼラチン、ソルビタン脂肪酸エステル

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



乗物酔いをさけるために、次の点にもご注意ください



バスでは、気分よくすごしやすい、前方の席や窓際の席を選びましょう。



飲みすぎや食べすぎはさげましょう。



おしゃべりや景色をながめて、気分よくすごしましょう。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)