

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

乗りもの酔いに/酔ってからでも効く

センバア S

第2類医薬品

〈乗物酔い薬〉

◆センバア Sは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防・緩和し、旅行や遠出を快適で楽しいものにするための薬です。



使用上の注意



してはいけないこと




(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- 2 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります)



相談すること



- 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。
緑内障
- 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難

- 3 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気

効能

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



めまい



吐き気



頭痛


用法・用量

次の量を水又はぬるま湯で服用してください。
乗物酔いの予防には乗車船の30分前に1回1錠を服用します。なお、必要に応じて追加服用する場合には、1回1錠を4時間以上の間隔をおき服用してください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)錠剤の取り出し方
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



年 令	1回量	服用回数
15才以上	1錠 	1日2回まで
15才未満	服用しないこと	

成 分

1錠中

成 分	分量	はたらき
塩酸メクリジン	25mg	嘔吐中枢への刺激伝達を遮断し、めまい・吐き気をおさえます。

添加物：D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、香料、デキストリン、乳糖、黄色5号

保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



乗物酔いをさけるために、次の点にもご注意ください



前夜は十分な睡眠が心がけましょう。



気分よくすごしやすい、前方の席や窓際の席を選びましょう。



飲みすぎや食べすぎはさげましょう。



適度なおしゃべりで気分よくすごしましょう。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)