

この添付文書は服用前に必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに保管してください。

乗物酔い薬 カムニス学童用

第2類医薬品

カムニス学童用は、バスや電車、船などの揺れによる刺激で生じる耳の奥にある三半規管の興奮を鎮め、嘔吐中枢の興奮を抑え、吐き気、めまいなどの乗物酔いによる症状を緩和する乗物酔い薬です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、乗物酔い薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人 排尿困難
 - (5) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
泌 尿 器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、眠気

■ 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

■ 用法・用量

次の量を服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
11歳以上15歳未満	2錠	4時間以上の間隔を
5歳以上11歳未満	1錠	おいて2回まで
5歳未満	服用しないこと	

(1)定められた用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分・分量

1錠中に次の成分を含有しています。

成 分	分量	はたらき
塩酸メクリジン	12.5mg	内耳器官と嘔吐中枢の興奮を抑え、めまい、吐き気、頭痛を鎮めます。
ピロドキシン塩酸塩	3.5mg	めまい、吐き気を鎮めます。

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、白糖、サッカリンNa、クエン酸、硬化油、無水ケイ酸、香料、トコフェロール、赤色3号、黄色5号を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■ 乗物酔いを避けるために、次の点にもご注意ください。

- ・乗物に乗る前夜は睡眠を十分にとりましょう。
- ・揺れが少ない前方の席や窓際の席を選びましょう。
- ・飲み過ぎ食べ過ぎはさげましょう。
- ・おしゃべりで気分を楽にしましょう。

■ お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。
日野薬品工業株式会社
お客様相談窓口
電話0748-52-1232 受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)