

乗りもの酔いに

成分・分量(1瓶20mL中)

塩酸メクリジン…………… 25mg
ジプロフィリン…………… 30mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物…………… 0.2mg
添加物として白糖、D-ソルビトール、パラベン、エタノール、香料、エチルパニリン、グリセリン、プロピレングリコール、バニリンを含有します。

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量


大人(15歳以上)1日1回1瓶(20mL)を服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元
日野薬品工業株式会社
滋賀県蒲生郡日野町上野田119
お問い合わせ先 ☎0748-52-1232

乗りもの酔いに



新シツク®液

第2類医薬品

20mL×2

乗物酔いによるめまい・はきけ・頭痛を
予防・緩和します。

乗りもの酔いに



この箱に記載の文書は服用前に必ずお読みください。

第2類医薬品

新シツク液

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
 - 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



■ 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5)次の症状のある人 排尿困難
 - (6)次の診断を受けた人
緑内障、心臓病、てんかん、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ