

服用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう本剤とともに大切に保管してください。

## 乗物酔い用薬

# トリブラS錠

第2類医薬品

トリブラS錠は、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛を防ぎ、さらに、気分が悪くなつてからでも、これらの症状をおさえられます。服用により旅行を楽しむことができます。

○トリブラS錠の有効成分はこんな働きをします。

塩酸メクリジン	自律神経や嘔吐中枢の興奮を抑え、めまい・吐き気・頭痛をしめます。
ジプロフィリン	揺れによって起こる感覚の混乱を抑制し、乗物酔いを予防します。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
- 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。  
(眠気等があらわれることがあります。)



#### 相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人  
    排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人  
    緑内障、てんかん、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
循 環 器	動悸
泌 尿 器	排尿困難

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
口のかわき、眠気

## [効能・効果]

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



## [用法・用量]

次の量を服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分～1時間前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1錠	1回
15歳未満	服用しないこと	

## [用法・用量に関する注意]

- (1) 本剤は、定められた用法・用量をお守りください。
- (2) 本剤の服用により、口のかわきがあらわれることがあります。
- (3) 本剤は口の中でとかしたりかみくだいたりせずに、そのまま水又はお湯で服用してください。

## [成分・分量]

成 分	1錠中
塩酸メクリジン	25mg
ジブロフィリン	30mg

添加物として乳糖、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mgを含有する。

## [保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## ○乗物酔いの予防のためのワンポイントアドバイス！

- ・十分な睡眠をとり、体調を整えましょう。
- ・旅行の前日、当日は空腹や食べ過ぎを避け、消化のよいものを食べましょう。
- ・揺れの少ない場所や換気のよい窓際に座りましょう。
- ・遠くの景色を見たり、おしゃべりをしてリラックスしましょう。
- ・体を締め付けない服装で姿勢を楽にしましょう。

## [問い合わせ先]

大木製薬株式会社 03-3256-5051 「お客様相談室」まで。

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元  大木製薬株式会社  
東京都千代田区神田錦町3-3

製造販売元 日野薬品工業株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町上野田119

A1411B