

乗りもの酔いに

ラフェルサ®

第2類医薬品

成分・分量(1瓶20mL中)

塩酸メクリン 25mg

ジプロフィリン 30mg

スコボラミン臭化水素酸塩水和物 0.2mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、パラベン、エタノール、香料、エチルバニлин、グリセリン、プロピレン glycol、バニリンを含有します。

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

大人(15歳以上)1日1回1瓶(20mL)を服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119

お問い合わせ先 ☎ 0748-52-1232

乗りもの酔いの 予防と緩和に

酔ってからでも効きます



乗りもの酔い薬
トラベリック液

20mL×2

乗りもの酔いに



第2類医薬品

この箱に記載の文書は服用前に必ずお読みください。

第2類医薬品

トラベリック液

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の症状のある人 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人 緑内障、心臓病、てんかん、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ