

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人 緑内障、心臓病、てんかん、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

【成分・分量】1日量(1瓶30mL)中  
塩酸メクリジン ……………50mg  
ジプロフィリン ……………30mg  
スコポラミン臭化水素酸塩水和物  
……………0.25mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、パラベン、エタノール、香料、トメントールを含有します。

## 【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## 【用法・用量】

15歳以上1回1瓶(30mL)を1日1回服用してください。ただし、乗物酔いの予防には乗車前30分から1時間前に服用してください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

発売元



大木製薬株式会社

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

お客様相談室 ☎ 03-3256-5051

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



日野薬品工業株式会社

滋賀県蒲生郡日野町上野田119