

乗物酔い薬

水なしでも服用できる! **スローソフトS**

第2類医薬品

販売名：乗り物酔い止めITM

スローソフトSは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和に効果をあらわす薬です。  
水なしでも服用できるので、旅行の途中で気分が悪くなったときでも、その場で服用できます。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)**

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気等があらわれることがあります。)

### 🗣️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
排尿困難
  - (5) 次の診断を受けた人。  
緑内障



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
口のかわき、眠気

## 成分と作用 本品1日量(6錠)中

成分	分量	作用
塩酸メクリジン	75mg	嘔吐中枢抑制作用により、乗物酔いによる吐き気、嘔吐、めまいなどの症状を予防、緩和します。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	12mg	消耗したビタミンを補い、乗物酔いによる吐き気をやわらげます。

添加物としてD-マンニトール、乳糖、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、トメントール、ステアリン酸Mg、スクラロース、香料、トコフェロール、オクテニルコハク酸デンプンNaを含有します。

## 効能又は効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



## 用法及び用量


乗物酔いの予防には乗車船30分前にかむか、口中で溶かして服用して下さい。  
なお、必要に応じて、追加服用する場合には、4時間以上の間隔をおき、服用して下さい。  
1日の総服用回数は、2回です。

年齢	大人 (15才以上)	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元

伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地

乗物酔い薬

水なしでも  
服用できる! スカイラブソフトS

第2類医薬品

販売名：乗り物酔い止めITM

スカイラブソフトSは、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和に効果をあらわす薬です。  
水なしでも服用できるので、旅行の途中で気分が悪くなったときでも、その場で服用できます。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等  
(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気等があらわれることがあります。)

### 🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。  
排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。  
緑内障



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

口のかわき、眠気

## 成分と作用 本品1日量(6錠)中

成分	分量	作用
塩酸メクリジン	75mg	嘔吐中枢抑制作用により、乗物酔いによる吐き気、嘔吐、めまいなどの症状を予防、緩和します。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	12mg	消耗したビタミンを補い、乗物酔いによる吐き気をやわらげます。

添加物としてD-マンニトール、乳糖、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、トメントール、ステアリン酸Mg、スクラロース、香料、トコフェロール、オクテニルコハク酸デンプンNaを含みます。

## 効能又は効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和



## 用法及び用量

乗物酔いの予防には乗車船30分前にかむか、口中で溶かして服用して下さい。  
なお、必要に応じて、追加服用する場合には、4時間以上の間隔をおき、服用して下さい。  
1日の総服用回数は、2回です。

年齢	大人 (15才以上)	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと

### <用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲み下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

■お問い合わせ先。

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度

☎0120-149931



製造販売元 **伊丹製薬株式会社**

滋賀県高島市今津町下弘部280番地