

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

乗り物酔いに

# ピタトラベル

ピタトラベルは、乗車船30分から1時間前の服用で、乗り物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防します。気分が悪くなってからの服用でも、乗り物酔いの症状を緩和します。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の乗り物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。  
排尿困難
- (6)次の診断を受けた人。  
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

## 【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## 【用法・用量】

次の量を、かむか口中で溶かして服用してください。

ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2錠	必要に応じて追加服用する場合には、服用間隔は4時間以上をおいて2回を限度としてください
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量などの服用方法をよく指導してください。

(3)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



## 【成分・分量】

2錠中の量

成分	分量
塩酸メクリジン	25mg
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.24mg

添加物として、セルロース、D-マンニトール、スクラロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、タルク、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わります。）

(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。



## 〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社廣昌堂

電話番号 076-424-3202

〔月～金 9:00～17:00（祝日を除く）〕

製造販売元 **株式会社廣昌堂**

富山県射水市水戸田2841

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）