

この説明文書は本剤とともに保管し、
服用前に必ずお読みください。

乗物酔いによるめまい・吐き気・
頭痛の予防及び緩和

テオラミン液

第2類医薬品

乗物に乗ると、気分が悪くなったり、吐き気やめまいを催す人がいます。これは、体内の速度や振動を感じる器官(三半規管)が異常に刺激されることで起こり、“酔う”と言われています。

★テオラミン液と乗物酔いの諸症状

本剤中のスコポラミン臭化水素酸塩水和物は、この異常に刺激された部分を鎮静し、速やかに不快感を除く作用を持っています。

しかも、乗物酔いは心臓に負担をかけやすいため、あらかじめ無水カフェインを配合して心臓の働きを強めておくと同時に、スコポラミン臭化水素酸塩水和物の副作用のひとつである眠気を弱めます。

このように組み合わされた本剤は、乗物酔いを未然に防ぐだけでなく、酔いを感じてからも鎮める作用を有しており、爽やかな香りと共に気分を爽快にしてくれます。

テオラミン液は、10mL の茶瓶に入った無色透明のシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

✖ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

7歳未満の小児

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

⚠ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 高齢者

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人 排尿困難

(6) 次の診断を受けた人 緑内障 心臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛

泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

成分と作用

成 分	1 瓶(10mL) 中	作 用
スコポラミン 臭化水素酸塩水和物	0.25mg	酔いを感じる器官の働きを遮断します
無水カフェイン	25mg	心臓の働きを強めるとともに眠気を防止します

添加物：白糖、DL-リンゴ酸、デヒドロ酢酸ナトリウム及び香料

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗物酔いの予防には、次の 1 回量を乗車船の 30 分前に服用してください。

年齢	成人(15 歳以上)	7 歳以上 15 歳未満
1 回量	1 瓶(10mL)	1/2 瓶(5mL)

なお、症状発現時に追加服用する場合は、上記 1 回量を 4 時間以上間隔をおいて服用してください。1 日の服用回数は 2 回を限度とします。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 内服にのみ使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限にかかわらず、開封後は速やかに服用してください。

★乗物酔いを避けるために、次のことも注意してください。

1. 乗物に乗る前夜は睡眠を十分にとってください。
2. 摆が少ない前方の席や窓際の席に座ってください。
3. おしゃべりやゲームで気分を楽にしてください。
4. 食べ過ぎ飲み過ぎは止めましょう。

★お問い合わせ先

日本薬品株式会社お客様相談室

〒841-0032 佐賀県鳥栖市大正町 716

電話 0942-82-2029 FAX 0942-82-2036

受付時間 9 時から 17 時まで (土、日、祝日を除く)

製造販売元
日本薬品株式会社
佐賀県鳥栖市大正町 716