

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

乗物酔いに1日1回
スパロンA

第2類医薬品

スパロンAは1日1回の服用で、乗り物の動揺や加速度によって起きる神経の興奮をしずめ、乗物によるめまい・吐き気・頭痛の発生をおさえたり、緩和します。車・船・航空機などに乗る約30分前に服用すれば不快な乗物酔いから解放され、旅行や趣味などがいっそう楽しくなります。

 使用上の注意

 **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人
緑内障、心臓病
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

下記の量を服用してください。ただし、乗物酔いの予防には、乗車船30分前に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 錠	1 回
7 歳以上15歳未満	1/2 錠	
7 歳未満	服用しないこと	

※本品は水なしでのめますが、かんだり口の中でとこしますと苦味が出ますので、早め
にのみこんでください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 錠剤の取り出し方：

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分と働き

1 錠中に次の成分を含有します。

成 分	分 量	働 き
塩酸メクリジン	25mg	内耳器官と嘔吐中枢の興奮を抑え、めまい、吐き気、頭痛をしずめます。
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.25mg	自律神経の興奮状態を緩和し、めまい、吐き気をしずめます。
無水カフェイン	40mg	脳血管に働き頭痛をしずめます。

添加物としてサッカリンNa、ステアリン酸Ca、セルロース、乳糖、パレイショデンプン、青色1号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1 錠を分割した残りを使用する場合には、清潔な紙に包み外箱中に保管し、2 日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〔乗物酔いをさけるための注意〕

★乗りもの酔いをさけるために、次の点にもご注意ください。

●乗りものに乗る前夜は睡眠を十分にとりましょう。



●揺れが少ない前方の席や窓際の席を選びましょう。



●飲み過ぎ食べ過ぎはさげましょう。



●おしゃべりで気分を楽にしましょう。



包装 6 錠入

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。
カシマ薬品商事株式会社 名古屋営業所 電話 フリーダイヤル0120-117-938
受付時間 土・日・祝日を除く 午前9時～午後5時

発売元



カシマ薬品商事株式会社
佐賀県鹿島市古枝字天神甲470-12

製造販売元

国産薬品工業株式会社
岐阜市秋沢370番2