

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のりもの酔いに

第2類医薬品

ジャーニメイト子供用

ジャーニメイト子供用は、乗車船30分から1時間前の服用で、乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の症状を予防します。気分が悪くなってからの服用でも、乗物酔いの症状を緩和します。

お子様に飲ませやすい、水なしで服用できるチュアブル錠です。



使用上の注意



してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、眠気、目のかすみ

裏面もよくお読みください。

【効能・効果】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

次の量を、かむか口中で溶かして服用してください。

ただし、乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
11歳以上15歳未満	2 錠	必要に応じて追加服用する場合には、服用間隔は4時間以上をおいて2回を限度としてください
3 歳以上11歳未満	1 錠	
3歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量などの服用方法をよく指導してください。

(3)3歳以上の乳児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【成分・分量】

1錠中の量

成 分	分 量
塩酸メクリジン	12.5mg
ピリドキシン塩酸塩	3.5mg
スコポリミン臭化水素酸塩水和物	0.08mg

添加物として、セルロース、D-マンニトール、スクラロース、銅クロロフィリンNa、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、タルク、ステアリン酸Mg、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】


(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

**〈お問い合わせ先〉**

本剤のご使用により、何かお気づきの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

日本薬剤株式会社「お客様相談窓口」

電話番号 076-424-2239

〔月～金 9:00～17:00 (祝日を除く)〕

製造販売元 **日本薬剤株式会社**

富山市東中野町一丁目1番1号

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)