

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品



「モリ」ハイツウ錠

特 徴

「モリ」ハイツウ錠は、薏苡仁、防已など成分欄記載の9種類の生薬で構成される和漢薬の、のみやすいエキス糖衣錠です。本剤の服用で、体の各部の神経に沿って走る痛み、関節の痛みやハシ、こわばりなど不快な症状が改善され、神経痛、リウマチに効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - 胃腸の弱い人。
 - 発汗傾向の著しい人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

神経痛、リウマチ

用法及び用量

次の量を朝夕空腹時に、水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(16歳以上)	3錠	2 回
15歳以下8歳以上	2錠	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させていただきます。

成分及び分量

本剤6錠(2.4g)中、下記生薬の水製乾燥エキス1.2gが含まれています。

ヨクイニン(薏苡仁).....2g	ケイヒ(桂皮).....0.75g
カンゾウ(甘草).....1g	シャクヤク(芍薬).....0.75g
ソウジュツ(蒼朮).....1g	ポウイ(防已).....0.25g
トウキ(当帰).....1g	ブクリョウ(茯苓).....0.12g
マオウ(麻黄).....1g	

添加物として、精製白糖、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6
電話(06)6629-9058
受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2