

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。  
また、必要なときにつつでも読めるよう保管しておいてください。

## 生薬煎剤

第2類医薬品

### 桔梗智辨 ろいま湯

桔梗智辨 ろいま湯は、鎮痛作用のあるボウイ・ボウフウ・ボタンピ・シャクヤク・カンゾウ・ケイヒ、消炎作用のあるダイオウ・ソウハクヒを配合した生薬の煎じ薬です。

#### △ 使用上の注意

##### ☒ してはいけないこと

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

##### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 高齢者
- (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人:むくみ
- (8) 次の診断を受けた人:高血圧、心臓病、腎臓病
- (9) 次の医薬品を服用している人:瀉下薬(下剤)

2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、激しい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- (2) 1ヶ月ぐらい服用しても症状がよくならない場合

3 服用後、軟便、下痢の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

4 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

#### ■ 効能・効果

神経痛、リウマチ、関節炎、痛風

#### ■ 用法・用量

成人(16歳以上)は、1日1包、1包に水360mLを加え、半量に煎じて、その煎液を1日3回に分け、食前に服用してください。小児は、以下の割合で同様に服用してください。

8歳以上 16歳未満: 成人の1/2量 3歳以上 8歳未満: 成人の1/3量  
3歳未満の乳幼児には、服用させないでください。

(食前とは、食事のおよそ30分前をいいます。)

#### <用法・用量に関する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### <煎じ方>

生薬を紙袋に入ったままの状態で容器に入れ、水を加えて、とろ火で煎じてください。

注意 1. 中の紙袋は、そのまま煎じられるよう特殊な紙を使用しています。

紙袋を破って中の生薬を、直接、容器に入れることは避けてください。

2. 容器は土製、陶製のものがよく、鉄製のものは避けてください。

3. 加熱はとろ火で行い、急速に煮沸させるのは避けてください。

4. 煎じた後は、熱いうちに、紙袋を引き上げてください。

#### ■ 成分・分量: 1包(13.5g)中

ボウイ(防己) ..... 5.5g ボウフウ(防風) ..... 2g  
ダイオウ(大黄) ..... 0.5g ボタンピ(牡丹皮) ..... 1g  
ソウハクヒ(桑白皮) ..... 2g シャクヤク(芍藥) ..... 1g  
ケイヒ(桂皮) ..... 0.5g カンゾウ(甘草) ..... 1g

#### ■ 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)。

#### ■ 問い合わせ先

チベン製薬株式会社 〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号  
電話: 072-622-2509 FAX: 072-625-6320

製造販売元 チベン製薬株式会社

大阪府茨木市西穂積町3番8号

ROI-PI-2