

2021年10月改訂

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。
また、必要などきにいつでも読めるよう保管しておいてください。

第2類医薬品 生薬煎劑

桔梗智辨 妙音湯

桔梗智辨 妙音湯は、解熱・鎮痛・抗炎症作用のあるサイコ・オウバク、鎮痛・鎮咳・去痰作用のあるカンゾウ、鎮痛作用のあるセンキュウ・トウキ、解熱作用のあるジオウ、鎮咳・去痰作用のあるバクモンドウ・バイモ・キョウニン、計9種の生薬を配合した煎じ薬です。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬
2. 長期連用しないこと

⚠ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人：高热、むくみ
(6) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■ 効能・効果

感冒・肺炎・肋膜炎・気管支カタルの熱を解し、咳を鎮め、胸痛を去る。

■ 用法・用量

成人(16歳以上)は、1日分1包に水630mLを加え、540mLに煎じつめ、その煎液を1日3回に分け、食間に服用してください。
小児は、以下の割合で同様に服用してください。
8～15歳：成人の1/2量 3～4歳：成人の1/6量
5～7歳：成人の1/3量 3カ月～2歳：成人の1/10量
3カ月未満の乳児には、服用させないでください。
(食間服用とは、食事のあと、2時間ぐらいたったところで服用することをいいます。)

<用法・用量に関連する注意>

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

<煎じ方>

生薬を紙袋に入ったままの状態で容器に入れ、水を加えて、とろ火で煎じつめてください。

- 注意1. 中の紙袋は、そのまま煎じられるよう特殊な紙を使用しています。紙袋を破って中の生薬を、直接、容器に入れることは避けてください。
2. 容器は土製、陶製のもがよく、鉄製のは避けてください。
 3. 加熱はとろ火で行い、急速に煮沸させるのは避けてください。
 4. 煎じつめた後は、熱いうちに、紙袋を引き上げてください。

■ 成分・分量：1包(14g)中

サイコ(柴胡)……………1.5g	オウバク(黄柏)……………0.5g
ジオウ(地黄)……………1.5g	カンゾウ(甘草)……………1.5g
バクモンドウ(麥門冬)…2.5g	キョウニン(杏仁)……………1.5g
センキュウ(川芎)……………1.5g	バイモ(貝母)……………2.5g
トウキ(当帰)……………1.0g	

■ 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

■ 問い合わせ先

チベン製薬株式会社 〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号
電話：072-622-2509 FAX：072-625-6320

製造販売元 **チベン製薬株式会社**
大阪府茨木市西穂積町3番8号

MYO-PI-5