

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

# 和漢薬製剤 小粒 打ち身丸

第2類医薬品

「小粒 打ち身丸」は、昔から伝わる家伝薬で丸い粒の丸薬です。小粒 打ち身丸に配合されています12種類の生薬が総合的に働いて、効果を発揮します。

特に打ち身（打撲症）などの痛みを緩和する作用や、それに伴ううっ血を抑える効果に優れております。また神経痛などにも効果をあらわし、現代においても常備薬として愛用されております。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効 能・効 果】

打ち身（打撲症）、神経痛、下腹部痛、手足の痛み、筋肉痛

## 【用 法・用 量】

次の量を、1日1回就寝時に白湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	10粒	1回
7才以上15才未満	5粒	
4才以上7才未満	3粒	
4才未満	服用しないこと	

（裏面もお読みください）

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 幼児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもと薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意して服用させてください。

## 【成 分・分 量】500粒中

シャクヤク末…8.0g	トウキ末…8.0g	ウコン末…8.0g
ソウジュツ末…8.0g	キジツ末…4.0g	ゴレイシ末…9.0g
ケイヒ末…9.0g	センキュウ末…6.0g	ホオウ末…6.0g
ケンゴシ末…15.0g	ジオウ末…8.0g	セイヒ末…8.0g

添加物として寒梅粉を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、4日以内に服用してください。その際、湿気などにより薬が変質することがありますので、冷蔵庫等に保管し、取り扱いには十分気をつけてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## 【お問い合わせ先】

本製品のお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

天恵堂製薬株式会社「お客様相談窓口」

電 話 0952-97-0036

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **天恵堂製薬株式会社**  
佐賀県佐賀市蓮池町蓮池234

### ※ 分包（10粒入り）開封時のご注意

分包の開封は赤色の目じるしに切り口があります。  
ここからゆっくりと開封してください。フィルムが硬いので急がれますと突発的に裂け、丸薬が飛び散る恐れがあります。また、指を切らないよう十分に注意してください。