

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃粘膜修復剤配合胃腸薬

胃腸薬

イノキュア胃腸薬細粒

第2類医薬品

胃の痛みやむかつきなどの胃の不快感は、ストレスや飲み過ぎなどにより胃粘膜が荒れ、胃壁が胃酸などで傷つくことで起こります。

- **イノキュア胃腸薬細粒**は、清涼感があり、水なしでも飲める細粒タイプの胃腸薬です。
- 胃に直接作用して炎症をしずめるアズレンスルホン酸ナトリウム水和物と、胃粘膜の生成を促すL-グルタミン、アルジオキサの3成分が胃粘膜を直接修復します。
- 胃酸を中和する制酸成分と消炎成分が損傷した胃粘膜を胃酸から保護し、胃の不快感に優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

必ずお読みください。



🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



効 能

胃痛、胸やけ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、飲み過ぎ(過飲)、胃部不快感、胃酸過多、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、嘔吐、げっぷ(おくび)

用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 服用回数 |
|-----------|---------|------|
| 成人(15才以上) | 1包 | 1日3回 |
| 11才～14才 | 2/3包 | |
| 8才～10才 | 1/2包 | |
| 5才～7才 | 1/3包 | |
| 5才未満 | 服用しないこと | |

※「食間」とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1.4g×3包中

| 成分名 | 分量 | 作用 |
|-----------------------|-------|--|
| メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム | 300mg | 持続的な胃酸中和、胃粘膜保護、ペプシンの活性抑制により、過剰な胃酸から胃を守ります。 |
| 合成ヒドロタルサイト | 800mg | 持続性のある制酸剤で、胃酸を中和し、胸やけや胃の痛み等を和らげます。 |
| 水酸化マグネシウム | 450mg | 速効性のある制酸剤で、胃酸を中和して胃を守ります。 |
| グリシン | 90mg | 制酸剤で中和された胃酸の濃度を一定に保つように作用します。 |
| アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物 | 6mg | 胃に直接作用して炎症をしずめ、胃粘膜を修復します。 |
| L-グルタミン | 400mg | 胃粘膜の生成を促して胃粘膜の修復を助けます。 |
| アルジオキサ | 120mg | 過剰な胃酸から患部を保護し、胃粘膜の再生・修復を促します。 |

添加物：エリスリトール、L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、D-ソルビトール

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0120-584-419
受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鷗1丁目139番地

FOA

1