

服用前に次の説明文を
必ずお読みください。

胃腸薬
イノセア胃腸内服液

第2類
医薬品

【使用上の注意】 **【してはいけないこと】**
(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください

【相談すること】 1. 次の人は服用前に医
師、薬剤師又は登録販売者にご相談くだ
さい (1) 医師の治療を受けている人。
(2) 次の診断を受けた人。 腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることが
ありますので、このような症状の持続又
は増強が見られた場合には、服用を中止
し、本品を持って医師、薬剤師又は登録
販売者にご相談ください 便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、本品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者にご相談くだ
さい

胃の痛み **第2類医薬品**
二日酔いのむかつきに

イノセア®

胃腸内服液

INOSEA SOLUTION

【成分・分量】 1瓶(30mL)中
スクラルファート水和物 500mg/メタケイ酸アル
ミン酸マグネシウム 500mg/合成ヒドロタルサイ
ト 250mg/コウボク流エキス 0.2mL(コウボク
200mgに相当)/ソウジュツ流エキス 0.2mL(ソ
ウジュツ200mgに相当)

添加物として、ヒドロキシプロピルデンプン、白糖、パ
ラベン、アルコール、香料(*l*-メントールを含む)を含有
します。

製造販売元 **佐藤製薬株式会社**
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
電話 03-5412-7393

【効能】

胃痛、胃部膨満感、
胃部不快感、胃重、
胸つかえ、もたれ(胃
もたれ)、胸やけ、げ
っぷ(おくび)、はきけ
(むかつき、胃のむか
つき、二日酔・悪酔の
むかつき、嘔気、悪
心)、嘔吐、飲み過ぎ
(過飲)、胃酸過多

【用法・用量】

大人(15歳以上)1回1瓶(30mL)、1日3
回食前又は食間に服用します。

☆15歳未満は服用しないでください。

＜用法・用量に関連する注意＞

☆服用前に瓶をよく振ってください。
定められた用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼
しい所に保管してください。(2) 小児の手の
届かない所に保管してください。(3) 他の
容器に入れ替えないでください。(誤用の
原因になったり品質が変わるおそれがあり
ます。)(4) 使用期限をすぎた製品は、服用
しないでください。

副作用救済制度 ☎0120-149-931