

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃痛、胸やけ、胃部不快感に

第2類医薬品

イスキット®

胃腸薬

〔特徴〕

- ・3種の胃粘膜修復剤が荒れた胃を正常な状態に戻します。
- ・2種の制酸剤が過剰の胃酸をすみやかに中和し、胃痛、胸やけ、胃部不快感などの不快な症状を改善します。
- ・清涼感のある溶けやすくのみやすい細粒です。



⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の方は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能〕

- ・胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- ・胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、飲み過ぎ(過飲)、胸つかえ

〔用法・用量〕

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
11歳～14歳	$\frac{2}{3}$ 包	
8歳～10歳	$\frac{1}{2}$ 包	
5歳～7歳	$\frac{1}{3}$ 包	
5歳未満	服用しないこと	

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)用法・用量を厳守してください。



〔成分〕

成人1日量3包(1.4g×3)中

成分		含量	はたらき
制酸剤	合成ヒドロタルサイト	800mg	過剰な胃酸をすばやく、かつ持続的に中和し、胃痛、胸やけ、むかつきなどの胃の不快な症状を改善します。
	水酸化マグネシウム	450mg	
胃粘膜修復剤	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	6mg	胃に直接作用して炎症を抑え、胃粘膜の修復を促します。
	アルジオキサ	120mg	荒れた胃粘膜を修復するとともに保護します。
	L-グルタミン	400mg	胃の粘膜成分の生成を促し、胃粘膜の修復を助けます。


添加物：D-ソルビトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントール、軽質無水ケイ酸

<成分に関する注意>

本剤の淡紫青色は、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物によるものです。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割して服用した残りは袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。



本剤を服用されて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、下記にご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ダイト株式会社 安全管理室 お客様相談係

〒101-0047 東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル 電話(03)5294-7147

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 **DMITO** **ダイト株式会社**
富山県富山市八日町326番地