



第3類医薬品

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

第3類医薬品

日本薬局方

炭酸水素ナトリウム

(重曹)

Sodium Bicarbonate

3g × 15包

販売名:炭酸水素ナトリウム「TJ」



製造販売元
大洋製薬株式会社
東京都文京区本郷3-14-16

F 12-T S

副作用あり

台異取確

副作用被害救済制度のお問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouigai.html
電話 0120-149-931 (7時~21時)

大洋製薬お客様相談窓口
0120-184328
受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜・祭日は除く)

日本薬局方

第3類医薬品

炭酸水素ナトリウム

(重曹)



外箱



4 975175 010481

2012年1月(記載要領変更に伴う改訂)

本剤の服用前に、この外箱の説明事項を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 1) 医師の治療を受けている人
 - 2) 次の診断を受けた人 腎臓病
2. 2週間位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、はきけ、悪心)おうと、飲み過ぎ、胃痛

用法・用量

食前または食間に服用する

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1/2包(1g)	3回
15才未満の小児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 定められた用法・用量を厳守すること

成分・分量

本品1g中に、日局 炭酸水素ナトリウム1gを含有する

保管及び取扱い上の注意

- 1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- 2) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 3) 誤用をさせ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- 4) 1) 1包の分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
- 5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

0000-2821

0 1 2 4 8

T190-16T