

服用するときは、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃の痛み・胃酸の逆流などによる胸やけ・胃部膨満感に効く

グッドナー[®]顆粒

第2類医薬品 制酸薬

特徴

- 胃粘膜の血流を改善して、荒れた粘膜を修復するセトラキサート塩酸塩を配合しています。
- 出過ぎた胃酸を中和して胃の不快感を速やかに取り除く合成ヒドロタルサイトおよび炭酸水素ナトリウムを配合しています。
- 胃の痛みやけいれんを抑えるロートエキスを配合しています。
- 携帯に便利なスティック包装で、外出先でも気軽に服用できます。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。)
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障、血栓のある人(脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等)、血栓症を起こすおそれのある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃・腹部膨満感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
□のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

母乳が出にくくなることがある。

効能・効果

胃の痛み、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、胸やけ、げっぷ、はきけ(むかつき、嘔気、二日酔・悪酔のむかつき)、嘔吐、飲みすぎ、胃酸過多

用法・用量

次の量を食間又は就寝前に服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満		服用しないこと


(食間とは、食事の約2時間後をいいます。)

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

成分

1日量(3包)中<1包1.3g>



淡褐色顆粒

- セトラキサート塩酸塩…………… 600mg
(胃粘膜の血流を増やして、荒れた胃粘膜を修復する)
- ロートエキス…………… 30mg
(胃の痛みやけいれんを鎮め、胃液の分泌も抑える)

白色顆粒

- 合成ヒドロタルサイト…………… 1200mg
- 炭酸水素ナトリウム…………… 600mg
(出過ぎた胃酸を中和し、胃の不快感をやわらげる)

添加物：白糖、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、*l*-メントール、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、セルロース

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店又は下記にお願い致します。

京都薬品ヘルスケア株式会社

〒604-8444 京都市中京区西ノ京月輪町38番地

T E L 075-803-1078

受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

® 登録商標