

第2類医薬品

イラクール胃腸液

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛

【成分・分量】

1日量 3包(1包10g)中

成分	分量
合成ヒドロタルサイト	3000mg
グリシン	300mg

添加物:D-ソルビトール、D-マンニトール、クエン酸水和物、サッカリンNa水和物、デヒドロ酢酸Na水和物、カルメロースNa、香料(メントール)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

紙 外箱 仕切り
分包:PE,PET



水なしで飲める

第2類
医薬品

液体タイプ

イラクール胃腸液

ストレス

緊張 急な

胃痛

胃もたれ

胃を守る成分 グリシン配合



6包
ミント風味

発売元
ダンヘルスケア株式会社
大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

製造販売元
新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

〈お問い合わせ先〉
ダンヘルスケア株式会社 お客様相談室
TEL:06-6441-0547
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



分包イメージ



販売名:
イラクール胃腸液

押して開ける

第2類医薬品

10g×6包

外箱は本剤とともに保管し、服用の際には必ずお読みください。

△【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

🩺【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)次の診断を受けた人。腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法・用量】

次の量を、食間空腹時に服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

液の飛び出しに注意し、分包の図の順序で開封して服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。