

【効能・効果】

胃痛、胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）

【成分・分量】1日量（3匙）中

合成ヒドロタルサイト .....1,500mg  
カンゾウ末（矯味剤） ..... 145mg  
ケイヒ末（矯臭剤） .....95mg

【用法・用量】

大人 15才以上 1回 1匙  
1日3回食間空腹時白湯又は清水にて服用する。  
服用間隔は4時間以上おくこと。

注意）（1）用法・用量を厳守すること。  
（2）小児には服用させないこと。

110g ￥9,000+（税）

成光薬品工業株式会社

外装フィルム 奈良県北葛城郡広陵町大塚739  
匙 相談窓口 0745-55-0044



成光薬品工業

# 成光胃腸薬141

## 胃痛・胸やけ・胃もたれに



第2類  
医薬品

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）  
1. 透析療法を受けている人は服用しないこと。2. 長期連用しないこと。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること（1）医師の治療を受けている人。（2）腎臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
循環器：立ちくらみ、脈が遅くなる  
精神神経系：強いねむけ、意識がうすれる  
その他：息苦しい、筋力の低下、口のかわき
- 服用後、便秘、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931