

第3類医薬品

服用に際して、説明文を必ずお読み下さい



スイマグ

生まれは海、育ちは自然の医薬品

せいさんやく しゃげやく げざい
制酸薬・瀉下薬(下剤)

- ◆スイマグは胃酸を抑え、便通を良くする薬です。
- ◆水と分離していますので、よく振り混ぜてからお使い下さい。

⚠ 使用上の注意

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、他の下剤を服用しないこと



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・医師の治療を受けている人
 - ・妊婦又は妊娠していると思われる人
 - ・激しい腹痛、はきけ・嘔吐の症状のある人
 - ・腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、激しい腹痛、はきけ・嘔吐の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. 服用後、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 2週間位(下剤として用いる場合には1週間位)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法及び用量】

<制酸薬として>

1日3回食前又は食間（食後2～3時間）に服用して下さい。

15歳以上	1回 4mL
11歳以上15歳未満	1回 2.5mL
8歳以上11歳未満	1回 2mL
3歳以上8歳未満	1回 1mL
1歳以上3歳未満	1回 0.5mL
1歳未満	服用しないこと

<瀉下薬（下剤）として>

1日1回就寝前（又は空腹時）に服用して下さい。但し、初回は最小量を用い便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量して下さい。

15歳以上	1回 16～26mL
11歳以上15歳未満	1回 11～17mL
7歳以上11歳未満	1回 8～13mL
3歳以上7歳未満	1回 6～8mL
3歳未満	服用しないこと

適当に水で薄めて服用しますと飲み易く、又有効です。計量カップ（キャップに目盛がついています）1目盛が1mLです。

<用法及び用量に関連する注意>

- ・定められた用法用量を厳守すること。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。



製造販売 株式会社 **三保製薬研究所**

〒424-0401 静岡県静岡市清水区中河内1513

TEL (054)396-3321 FAX (054)396-3371

お客様相談窓口 TEL (054)396-3375 (8:30～16:30)

↓使用期限及び製造番号は容器底部に表示してあります。

【効能又は効果】

＜制酸薬として＞

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

＜瀉下薬（下剤）として＞

・便秘・便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【成分及び分量】

26mL中 酸化マグネシウム 1.79g含有
(水酸化マグネシウムとして 9.99w/v%) 360mL



副作用救済制度

☎0120-149-931



ボトル：PE

キャップ：PP

外被フィルム：PET

..... 保管及び取扱い上の注意

- ・ 冬期凍らないよう保管すること（凍ると変質します）
- ・ 使用後はキャップをきれいに洗いしっかり栓をすること
- ・ 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管すること
- ・ 小児の手の届かない所に保管すること
- ・ 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）