

2019年9月

この説明書は本剤とともに保管し、  
服用に際しては必ずお読みください。

## 第2類医薬品

胸やけ・胃もたれ・飲みすぎ

# フキ胃腸薬

フキ胃腸薬は制酸剤、健胃生薬などを配合した胃腸薬で、胃もたれ、胸やけ、胃部不快感、飲みすぎなどを改善し、正常にもどすのに効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 次の診断を受けた人。  
腎臓病、甲状腺機能障害



裏面もお読みください

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、下痢
- 3.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)15才未満の小児は服用しないでください。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

### ■お問い合わせ先

ワキ製薬株式会社 お客様相談室

住所 奈良県北葛城郡広陵町南郷898

電話 ☎0120-200-114

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

URL:<http://www.a-kusuri.co.jp/>

## 容器の開け方



ツマミを図の様に回しながら  
引きちぎってください。

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

### ●効能又は効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、  
胸つかえ、げっぷ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・  
悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ、胃痛

### ●用法及び用量

15才以上1回1g1日3回食後服用する。  
尚、別添のサジを使用する。

### ●成分及び分量【1日量(3g)中】

ガジュツ末	180mg
ケイヒ末	300mg
炭酸水素ナトリウム	930mg
合成ケイ酸アルミニウム	530mg
炭酸マグネシウム	450mg
沈降炭酸カルシウム	580mg

添加物としてカンゾウ末、D-メントールを含む。

第2類医薬品

胸やけ・胃もたれ・飲みすぎ

# ワキ胃腸薬

製造販売元

ワキ製薬株式会社

奈良県北葛城郡広陵町南郷898

### ●使用上の注意

1. 次の人は服用しないこと。透析療法を受けている人。
2. 服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して  
保管すること。
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

NET 120g

(本体価格1,200円+消費税)



:袋  
:サジ  
:容器  
:外装フィルム

使用期限

製造番号