

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



# 胸やけ、飲み過ぎ、胃の痛み パンクターゼG

第2類医薬品

## 作用と特徴

- ・パンクターゼGは、荒れた胃の粘膜を修復するとともに、過剰に分泌された胃酸を速やかに、且つ持続的に中和し、胃の神経を鎮めて胃酸の出すぎを抑えます。
- ・パンクターゼGは、健胃生薬配合で弱った胃の働きを回復させ、不快な症状を和らげて胃の働きを正常にします。
- ・パンクターゼGは、空腹時やおやすみ前に服用することにより、成分が有効に働きます。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)次の症状のある人。  
排尿困難  
(6)次の診断を受けた人。  
腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

## 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ(過飲)、胃痛

(裏面もお読みください)

## 用法・用量

次の量を食間<sup>注</sup>)に服用してください。

| 年 令         | 1 回量       | 服用回数    |
|-------------|------------|---------|
| 成人 (15才以上)  | 1 包        | 1 日 3 回 |
| 11才以上15才未満  | 2/3包       |         |
| 8 才以上11才未満  | 1/2包       |         |
| 5 才以上 8 才未満 | 1/3包       |         |
| 3 才以上 5 才未満 | 1/4包       |         |
| 3 才未満       | 服用しないでください |         |

### (用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

<sup>注</sup>「食間」とは、食後2～3時間を指します。

## 成分・分量 (1.3g×3包中：成人1日量)

| 成 分            | 分 量                      |
|----------------|--------------------------|
| 銅クロロフィリンナトリウム  | 75mg                     |
| ケイ酸アルミン酸マグネシウム | 900mg                    |
| 炭酸マグネシウム       | 750mg                    |
| 沈降炭酸カルシウム      | 600mg                    |
| ロートエキス5倍散      | 150mg<br>(ロートエキス30mgに相当) |
| ケイヒ末           | 200mg                    |
| チョウジ末          | 24mg                     |

添加物として、D-ソルピトール、乳糖水和物、カルメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、トメントール及び香料を含有します。

### (成分・分量に関連する注意)

本剤の服用後、便が緑色になる場合がありますが、銅クロロフィリンナトリウム(緑色)が排泄されるための着色で心配ありません。

## 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## 胃腸の養生法

○暴飲暴食を避け、食事は毎日規則正しい時間に、消化しやすく栄養価の高いものを腹八分目にとりましょう。

○食後少なくとも20～30分は静かに過ごし、胃腸の働きを円滑にしましょう。

○酒、タバコ、濃いコーヒー、香辛料など胃を刺激するようなものを控えましょう。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：058-278-3933

受付時間：10時～16時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元 小林薬品工業株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町40番  
製造販売元 株式会社パナケイア製薬 富山県高岡市中田4576番地